

# Bestimmungshilfen für Möwen

Regelmässige Arten	Kennzeichen	Ähnliche Arten
LACHMÖWE <i>Larus ridibundus</i>	Unter den regelmässigen Arten Mitteleuropas unverwechselbar: in allen Kleidern weisser keilförmiger Handflügelvorderrand und kontrastierend 2-farbige Handflügelunterseite.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>DÜNNESCHNABELMÖWE</u> (Ausnahmeerscheinung): Gefieder ausser adultes Sommerkleid sehr ähnlich Lachmöwe. Immature und Winterkleider mit sehr kleinem oder fehlendem Ohrfleck, meist heller Iris, längerem Schnabel mit weit nach vorne reichender Oberschnabelbefiederung, langem „Giraffen“-Hals, typischer vorgeneigter Schwimmhaltung, wobei Beine häufig sichtbar sind.</li> <li>• <u>BONAPARTEMÖWE</u> (in der Schweiz nicht nachgewiesen): Kleiner als Lachmöwe, in allen Kleidern Flügelunterseite einfarbig hell mit schwarzem, scharf abgesetztem HS-Hinterrand, Schnabel schwarz. Im 1. Jahr weisser Flügelkeil auf Oberseite durch schwarze äussere Grosse Handdecken unterbrochen.</li> </ul>
ZWERGMÖWE <i>Larus minutus</i>	In allen Kleidern geringe Grösse (deutlich kleiner als Lachmöwe), relativ kurze und rundliche Flügel, seeschwalbenhafte Nahrungssuchflüge und kurze Beine auffällig. Ab 2. Winter durch vorwiegend weisse Flügelspitze und ± schwarze Flügelunterseite unverkennbar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>DREIZEHENMÖWE</u> : im 1. Jahr bei oberflächlicher Betrachtung ähnlich, aber: grösser als Lachmöwe, mit proportional längeren und schmalere Flügel und kräftigerem Flugstil, Arm- und innere Handschwingen immer weiss, schwarzes Nackenband und schwarzes Diagonalband auf Oberflügel im Jugendkleid deutlicher abgegrenzt. Rücken immer grau. Scheitel nie schwärzlich, höchstens mit grauem Hinterkopf. Im Stehen durch sehr kurzen Lauf und aufrechte Haltung auffällig.</li> <li>• <u>BONAPARTEMÖWE</u> (in der Schweiz nicht nachgewiesen): durch ähnliche Grösse besteht potentielle Verwechslungsgefahr, aber in allen Kleidern Flügelunterseite einfarbig hell mit schwarzem, scharf abgesetztem HS-Hinterrand sowie weisser Flügelkeil auf Oberseite, im 1. Jahr durchgehend schwarzer Flügelhinterrand und fehlendes Nackenband kennzeichnend.</li> <li>• <u>SCHWARZKOPFMÖWE</u>: Adulte haben mit Zwergmöwe die weissen Handschwingen gemein, sind aber von jener problemlos durch Grösse, weisse Unterflügel, starken Schnabel, auffällig nasalen Ruf etc. zu unterscheiden.</li> </ul>
DREIZEHENMÖWE <i>Rissa tridactyla</i>	Ab 2. Winter durch einheitlich schwarze Flügelspitze („in Tinte getaucht“), gelben Schnabel, kurze schwärzliche Beine unverwechselbar. Die in manchen Bestimmungsbüchern hervorgehobene Einkerbung des Schwanzes ist unter Feldbedingungen meist nicht sichtbar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ZWERGMÖWE</u> : im 1. Jahr bei oberflächlicher Betrachtung ähnlich, aber: kleiner als Lachmöwe, mit proportional kürzeren und runderen Flügeln und flatterhaftem Flugstil, Arm- und innere Handschwingen gräulich (nicht weiss), schwärzliches Nackenband und Diagonalband auf Oberflügel anfangs breit und dann mit dem dunklen Rücken des Jugendkleides zusammenfliessend. Scheitel oft ausgedehnt schwärzlich. Im Stehen horizontale Haltung auffällig, erinnert an Seeschwalbe, Beine fleischfarben oder rot.</li> <li>• <u>SCHWALBENMÖWE</u> (Ausnahmeerscheinung): In allen Kleidern durch dreifarbiges Dreiecksmuster der Oberseite eigentlich unverwechselbar. Bei schlechten Bedingungen (grosse Distanz, hoher Wellengang etc.) kann aber schon einmal eine junge Dreizehenmöwe zur Schwalbenmöwe „gemacht“ werden, besonders weil das Grau der Oberseite bei der Dreizehenmöwe je nach Stellung erstaunlich stark variieren kann und die inneren Handschwingen heller gefärbt sind als der Mantel.</li> </ul>

<p>STURMMÖWE <i>Larus canus</i></p>	<p>3 Altersklassen unterscheidbar. Ab 1. Winter einheitlich grauer Rücken (viel dunkler als Lachmöwe), im 1. Jahr mit scharf abgegrenzter Schwanz-endbinde, dunklem Armschwingerband und dunklen äusseren Handschwinger. Ab 2. Jahr Schwanz weiss. Die grossen weissen Spitzenflecke der Handschwinger der Altvögel ergeben auf Distanz häufig den Eindruck eines stark abgerundeten Flügels. Schnabelfarbe variabel: im 1. Winter rosa mit schwarzer Spitze, später grünlichgelb bis grünlichgrau, im adulten Sommerkleid gelb, im Winter zusätzlich oft mit dunkler Binde, Augen dunkel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>SCHWARZKOPFMÖWE</u>: im 1. Jahr ähnlich, aber: viel hellerer Rücken (noch heller als Lachmöwe), stärker kontrastierende Flügelzeichnung durch schwärzere Hand- und Armschwinger sowie hellgraue Grosse Decken, lachseeschwalbenhafte Kopfmaske, dunkler kräftiger Schnabel.</li> <li>• <u>RINGSCHNABELMÖWE</u> (in der Schweiz nicht nachgewiesen): in allen Kleidern sehr ähnlich, aber Rücken ausser im Jugendkleid viel heller (wie Lachmöwe), Schnabel kräftiger (viel dicker als Augendurchmesser). Im 1. Jahr oberseits kontrastreicher, Schwanzbinde nicht scharf abgegrenzt, Grosse Armdecken hellgrau mit dunklen Abzeichen, Schirmfedern dunkler mit schmalen hellen Säumen. Vorsicht: Silbermöwen im 2. Jahr können mit Ringschnabelmöwen im 1. Jahr verwechselt werden! Sie haben aber quergestreifte Grosse Decken und kompliziertes Schirmfedermuster. Im 2. Jahr Iris meist schon hell, Schwanz noch mit unvollständiger Binde. Altvögel mit kleineren weissen Subapikalflecken in den äussersten Handschwinger und ganzjährig mit ausgeprägtem Schnabelring.</li> <li>• <u>DREIZEHENMÖWE</u> : adult ähnlich, aber: etwas kleiner, Flügelspitze und Beine ganz schwarz, Beine kurz. Im Winter ohne Kopfstrichelung, dafür mit grauem Nacken und Ohrfleck.</li> <li>• graumantlige Grossmöwen: adulte Grossmöwen unterscheiden sich von adulten Sturmmöwen durch Grösse, Schnabelform, -farbe und -grösse, Proportionen (längerer Kopf, breitere Flügel) und wuchtigeren Flugstil. Weisskopfmöwen im 2. Winter haben eine verblüffende Ähnlichkeit in der Oberseitenfärbung mit Sturmmöwen im 1. Winter. Man beachte die gemusterten Grosse Decken und Schirmfedern der Grossmöwe.</li> </ul>
<p>SCHWARZKOPFMÖWE <i>Larus melanocephalus</i></p>	<p>Altvögel durch sehr helle Oberseite (im Flug auf Distanz weiss wirkend), vollständig weisse Flügelspitze und dunkelroten Schnabel unverwechselbar. Im 2. Jahr ist die weisse Flügelspitze durch in der Ausdehnung variable schwarze Flecken gemustert. Dieses Merkmal erinnert an gleichaltrige, ansonsten aber völlig anders gebaute Zwergmöwen. Im 1. Jahr ist die künftige Weissfärbung der Handschwinger durch helle Flecken auf den Innenfahnen auch der äussersten HS angedeutet, was aber nur bei stark gespreiztem Flügel sichtbar ist.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STURMMÖWE: vgl. oben.</li> <li>• LACHMÖWE: obwohl einfach zu unterscheiden, kann eine adulte Schwarzkopfmöwe inmitten einer grossen Lachmöwenkolonie schwierig zu finden sein. Die (mehrheitlich) weissen Flügelspitzen der Schwarzkopfmöwe sind besonders bei schlafenden Möwen, wenn die Einzelheiten der Kopfzeichnung nicht sichtbar sind, abgesehen von den sehr verschiedenen Rufen, das beste Merkmal.</li> </ul>