ORNITHOLOGISCHER RUNDBRIEF
für das Bodenseegebiet

Schweizerische Vogelwarte
CH-6204 Sempach

zusammengestellt von
Arne Brall, Gerhard Knöttsch, Siegfried Schuster und Hanns
Werner
für die
ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT BODENSEE

Nur zur persönlichen Information; gilt nicht als Veröffentlichung!

E i n l a d u n g

zur Zusammenkunft der OAB am 8. November 1986

Die Tagung findet wieder im Hotel Sonne (früher Kolpinghaus)
in Friedrichshafen statt und beginnt um 16 Uhr.

Vorgesehene Vorträge:

Prof. Dr. P. Berthold: Erste Ergebnisse aus dem MRI-Programm
der Vogelwarte Radolfzell

Dr. W. Frenzel: Kann der Kormoran zum Problemvogel werden?

M. Hemprich: Auswertung der Zugplanbeobachtungen Krisk. 1980 -
1985

W. Schümperlin: Entwicklung der Schafstelzenpopulation Stein/
Diessenhofen 1983 - 1986

H. Reinhardt: Greifvogel-Brutbestandsaufnahme Bodanrück 1986

Kurzberichte über die Ergebnisse der Fangstation Mettnau (RS)
und die Zugplanbeobachtungen Hornspitze (GA).

A. Müller: Ornithologischer Filbericht aus Island.

Bitte notieren Sie den Termin - es erfolgt keine separate Ein-
ladung mehr!

S p e n d e n

Wir bedanken uns für folgende Spenden, die auf unseren Konten
724 810 01 Schweizerische Bankgesellschaft Kreuzlingen,
660 22658 00 Bad.-Württ. Bank Konstanz (BLZ 690 200 20),
1900 968 Raiffeisenkasse Rieden-Vorkloster in Bregenz
eingegangen sind: G. Battaglia 20,-Sfr., G. Homann 40,-DM, G.
Ladstätter 200,-GS, A. Müller 30,-DM, A. Simon 30,-DM.

Bericht über den Sommer 1986 (abgeschlossen am 21.9.1986):

Abkürzungen siehe OR 101, zusätzlich:
HR L. und H. Reinhardt Ast A. Stierli

23. Okt. 1986

Spatis...

Gerhard Knöttsch
Mollstr. 11
7090 Friedrichshafen 1

Allgemeine Bemerkungen: Der Sommer 1986 war geprägt von zwar durchweg zu hohen Temperaturen, aber - mit Ausnahme des Juni - extrem hohen Niederschlagsmengen. Daraus resultierte ein sehr früher und schneller Anstieg des Seepegels: 350cm waren in Konstanz bereits am 5. Mai überschritten - dadurch überaus günstige Brutbedingungen für die Lappentaucher. Der Pegelhöchststand wurde außerordentlich früh am 6./7. Juni erreicht. Ähnlich früh gab es dies nur in den Niedrigwasserjahren 1964 und 1976, damals jeweils unter 400cm, heuer mit 470cm um 20cm über dem langjährigen Durchschnitt. Ab 8. Juni sank der Wasserspiegel wieder kontinuierlich mit Ausnahme Anfang Juli, als der See innerhalb von zwei Tagen um 16cm anstieg. Diese Entwicklung begünstigte natürlich vor allem spät brütende Entenarten wie die Reiherente. Die Hauptmasse der Stockentenfamilien erschien erst ab Ende Juni. Im Vergleich zum Vorjahr war der Bruterfolg eher gering - offenbar weil die großen ersten Gelage verloren gingen. Drei Purpurreiherreviere im Rhd. sind ebenfalls dem hohen Wasserstand zu verdanken. Der Birkenzeisigbestand zeigt eine deutliche Stabilisierung. Bei der Beutelmise war 1986 mit 10 Revieren das bisherige Spitzenjahr.

Der Bekasinenbestand ist trotz des günstigen hohen Niederschlags am westlichen Bodensee z.T. erheblich zurückgegangen. Die Brachvögel im Rhd. und Weitenried blieben wieder einmal ohne Bruterfolg!

Wetterdaten, mitgeteilt von der Wetterwarte Konstanz:

	Mai	Juni	Juli	August
Monatsmitteltemperatur	15,2	17,0	18,0	17,8
langjähriger Durchschnitt	12,7	16,4	18,0	17,0
Niederschlagsmenge in mm	111,3	100,7	138,4	128,9
langjähriger Durchschnitt	87,1	97	100	100
Pegelmittel Konstanz in cm	384	455	419	371
langjähriger Durchschnitt	362	423	433	407

- - - - -

Die einzelnen Arten:

Prachtaucher: Siehe OR 101! Am 9.6. bei Frhf.-Fischbach 2 im Ruhekleid (BS) und am 18.6. einer im Ruhekleid bei Kesswil (BJ).

Zwergtaucher: Etwa 30 Familien im Erm. (J.Heier, BJ). Im Rhd. etwa 12 Familien mit mind. 27 juv. (VB), im Erisk. nur 1 Paar (MH, GK, G.Stadler). Killenweiher 7 Familien mit mind. 10 juv. (HWe). An der Stockam. 4 Familien mit mind. 6 juv. und im Schanderied wieder 1 Paar (HWe). Am Hagstaffelweiher bei Dettingen, im Dingelsdorfer und im Bündlisried bei Allensbach je eine erfolgreiche Brut mit 3, 1 bzw. 3 Jungen (T.Jaich) - im Bündlisried aber mind. 5 Reviere und im Nügelried Allensbach erstmals ein Revier (SS). Interessant die Verpaarung eines ♂ mit 3 brütenden ♀ am periodischen Litzelsee Markelfingen, wobei die erste Brut in einem überschwemmten Gerstenfeld stattfand (SS).

Haubentaucher: Mit über 430 Familien ein sehr guter Bruterfolg, wobei gleich zwei Extremdaten gemeldet wurden: MH und G.Stadler beobachteten schon am 10.5. im Schussen-Altwasser bei Erisk. eine Familie mit 2 etwa 2tägigen Jungen und SS sah am 14.9. an der Mett. noch eine Familie mit 2 etwa 5tägigen Jungen. Mehr als 91 Familien im Erm. und 85 in der Hegnebucht (MD, BJ), Mett. 77 Familien mit 117 juv., darunter zweimal je 5, und Radam. 36 Familien (AB, H.P., Fischer, ASm). Ein hervorragendes

(Nr. 102/September 1986)

Brutergebnis an der Stockam.: 53 Familien mit 67 juv. (HWe). Der Bruterfolg im Erisk. lag mit 29 Familien und 67 juv. bei durchschnittlich 2,3 juv. (M.Deutsch). 215 juv. im Rhd. (Zählung zwischen 11. und 15.7.) werden von VB als 70% des tatsächlichen Bestandes geschätzt. Kstz.-Horn 15ad/13juv. und Mainaubuchten 70ad/20juv. (T.Jaich). Vermutlich um Zweitbruten handelt es sich am Mindelsee, wo ab Mitte August 5 Familien mit ganz kleinen Jungen beobachtet wurden, nachdem sich dort schon Mitte Juli 6 Familien mit Jungen aufhielten (RS,GT).

Rothalstaucher: Möglicherweise zwei Übersommerungen: Am 22.6. 2 im Prachtkleid bei Kesswil, dann vom 3.7. bis 17.7. im Erm. und bis zum 30.7. dort noch 1 Vogel (HJ) und 5 Daten eines ad Vogels zwischen 5.6. und 27.7. im Bereich Moos-Gundholzen (AB). Außerdem 1 ad am 20.7. bei Erisk. (M.Deutsch, GK).

Ohrentaucher: Nachtrag: Am 26.4. einer im Prachtkleid und einer im Übergangskleid an der Stockam. (HWe).

Schwarzhalstaucher: Sehr guter Bruterfolg, insgesamt mind. 76 Brutpaare! Allein im Erm. und Hegnebucht 64 (47 + 17) Familien (HJ). Radam. 6 Familien mit 10 juv. (GA, AB, H.P.Fischer, ASm) und Iznang 3 Familien mit 6 juv. (SS, AF). Im Rhd. 2 Bruten mit 4 Jungen (VB, W.Fiedler, BSm, PW). An der Stockam. eine Familie - HR beobachtet am 13.8., wie eines der beiden Jungen gefüttert wurde, jedoch wurden vorher dort keine Schwarzhälse festgestellt. Mauerstrapps: 28.7. Erm. 403 (darunter auch juv, HJ) und am 4.8. dort 300 (T.Jaich). Im Rhd. 140 am 15.8. - fast alles ad (SS).

Kormoran: An zwei Stellen Übersommerungen: Im Erm. im Juni maximal 4 am 15.6., im Juli vor dem 27.7. maximal 6 am 19.7., ab 27.7. deutliche Zunahme (HJ, EPha). 1 Vorjähriger im Juni und Juli Erisk. (M.Deutsch, G.Stadler u.a.).

Zwergdommel: Im Rhd. - fast ausschließlich rings um das Sd! - mindestens 10, wahrscheinlich sogar 12 Reviere bei "mäßigen" Bruterfolg (VB), im Wollr. nur 1 Paar am 15.6. (HJ). Am Hagstafelweiher und im Bündlisried je 1 Rufer (SS).

Nachtreiher: Trotz starkem Einflug im Frühjahr im Rhd. keine Brut (vgl. OR 101), aber Übersommerung 1ad und 1 immat. (VB, ASö). Im Wollr. 1 am 24.6. (HJ), über Immenstaad am 23.6. nachts 2 rufend (BS).

Rallenreiher: 1ad übersommerte im Rhd. (VB), letzte Beobachtung am 13.8. (K.Müller). Vom 22. bis 26.6. im Erisk. 1ad (E.Steppacher u.a.).

Graureiher: In der Kolonie Hemishofen mit 27 fast dieselbe Horstzahl wie im Vorjahr (UW), 7 besetzte Horste bei Volkertshausen (SS) und am Gehrenberg 2 - 3 Paare (GK). Eine sehr späte Einzelbrut auf der Mett.: 20.8. Horst mit 4 fast flüggen juv. (R.Oppermann, SS) - erste Brut seit 30 Jahren! Zwischen 1.6. und 4.7. maximal 17 am 17.6. im Erisk. (MH, GK, G.Stadler) und im Erm. am 21.7. 33 sowie 58 am 30.8. (HJ). Im Dingeldorfer Ried maximal 6 am 29.6. (T.Jaich).

Purpureiher: Der hohe Wasserstand im Frühjahr führte gleich zu 3 Revierbildungen im Rhd., nämlich Fb, Rsp und Sd - jedoch war wahrscheinlich nur die Brut im Sd. erfolgreich - dort 4 juv. ab 23.8. (VB, PW u.a.). Am 22.4. und 4.5. je 1 im Wollr. (J.Heier, HJ u.a.) und am 4.6. im Erisk. 3 fliegende (SS).

Höckerschwan: Kstz. - Erm. insgesamt 6 Familien mit 20 juv., darunter 1 albinoider (HJ, RSo) und im Rhd. 8 Familien mit 22 juv. (VB). Mauerensammlungen am Erm. ab 11.5. mit 110 ständig an-

wachsend bis maximal 384 am 3.8. (HJ, T. Jaich), in der Ketz. Bucht maximal 120 am 6.7. (HJ) und im Erisk. 94 am 17.6. ebenfalls anwachsend auf 234 am 4.7. (MH, GK).

Graugans: Da bei Überlingen-Ost am 6.7. eine Familie mit 2 juv. festgestellt wurde (Ch. Gönner), muß auch 1986 wie im Vorjahr eine Brut stattgefunden haben (wo?, vgl. OR 98).

Kanadagans: Erfolgreiche Brut mit 2 juv. Mett. (W. Fiedler, ASm, SS).

Brandgans: Am 1.5. und 26.7. jeweils 5 im Erm. (MD, HJ).

Pfeifente: 2 Sommerbeobachtungen im Erm.: 17.7. ein ♂ im Ruhekleid und am 19.7. ebenfalls 1♂, aber im Prachtkleid (HJ).

Schnatterente: Radam. 8 Familien mit 68 juv. (AB, HR u.a.), Mett. 6 Familien mit 49 juv. (HR, SS, H.P. Fischer), Erisk. 3 Familien - 2 juv. schlüpften erst Anfang September! (M. Deutsch, MH, GK), Immenstaad 3 ♀ mit 9,7 und 1 juv. (BS, Chr. Braunberger). Im Erm. stieg die Zahl der Mausergäste von 410 am 19.6. (MSch) auf 1080 am 25.7. (HJ).

Krickente: Im Wollr. zwei Paare bis Mitte Juni (A. Hafen, HJ). Im Dingelsdorfer Ried ebenfalls 2 Paare bis Mitte Juni, in der 2. Junihälfte bis zu 10 Mausergäste (A. Hafen, T. Jaich).

Stockente: Wollr. mind. 30 Familien (MD, J. Heier, HJ), Mett. 36 Familien mit 216 juv. - in 3 Familien zusätzlich 16 Kolbenpulli (H.P. Fischer, HR, SS), Rhd. 18 Familien mit 118 juv. (VB), Radam. 12 Familien mit 72 juv. (AB, HR). Im Segertenweiher Horn/Höri führte 1♀ 5 eigene juv. und 4 Reiherpulli (HR). In Frhf. erfolgreiche Brut auf dem Balkon im 5. Stock eines Hochhauses - ♀ und 10 pulli wurden eingefangen und an der Rotachmündung ausgesetzt (GK).

Kolbenente: Im Wollr. 34 Familien mit 238 juv. - mind. dreimal schlüpften die juv. erst in der 2. Augusthälfte (J. Heier, HJ), Mett. 17 Familien mit 87 juv. (H.P. Fischer, HR, SS), Radam.-Iznang 3 Familien mit 20 juv. (AB, HR), Rhd. 8 Familien mit 62 juv. (VB, AS5). Erfolgreiche Einzelbruten im Strandbad Frhf. mit 7 juv. (M. Deutsch) und im Bundesbahnhofen Ketz. mit 5 juv. (BPo). Der Mauserplatz Wollr. (Erm. und Hegnebucht) war im Juni/Juli mit ca. 900 Ex. besetzt (HJ).

Tafelente: Mett. 9 Familien mit 27 juv. (H.P. Fischer, HR, SS), Radam. 7 Familien mit 36 juv. - in 2 Familien zusätzlich 4 Kolbenpulli (AB, HR), Wollr. 2 Familien 10 + 6 juv. (J. Heier, HJ), Segertenweiher Horn 2 Familien mit 3 + 6 juv. (HR). Im Erm. 250ad am 25.7. und Erm./Hegnebucht 1430 am 20.8. (HJ).

Reiherente: Mett. 103 Familien (!!) mit 528 juv. - in 33 Familien zusätzlich 72 Kolbenpulli und in 1 Familie 4 Tafelpulli (H.P. Fischer, HR, SS), Radam. 42 Familien mit 232 juv. - in 13 Familien zusätzlich 21 Kolbenpulli (AB, HR), Wollr. mind. 29 Familien mit 116 juv. - zusätzlich 48 Kolbenpulli in 13 Familien (MD, HJ), Segertenweiher Horn 4 Familien mit 21 juv. (HR, UW), Bündlisried Allensbach 3 Familien 17 juv. (HR, SS), Nägelried Allensbach 1 Familie mit 8 juv. (SS), Aachried bei Rickelshausen 4 Familien mit 26 juv. (HR, SS), je 1 Familie mit 4 bzw. 3 juv. am Martinsweiher und Bifangweiher Salem (Ch. Gönner, SS). Mit mind. 188 Familien - gegenüber 141 im Vorjahr - das beste Brutergebnis bei dieser Art. Als die am spätesten im Jahr brütende Ente wurde sie vom merkwürdigen Pegelregime dieses Sommers mit einer sehr frühen Spitze und dem stetigen Sinken begünstigt. Im Erm. sammelten sich in der 2. Julihälfte bis

(Nr. 102/September 1986)

1700 ad, die dann schlagartig verschwanden (HJ). Mett. im August mind. 5 in Vollmauser(SS). Leider wurde der Mauserplatz Mindelsee im August nicht kontrolliert.

Schellente: Siehe OR 98. Im Erisk. 2,1 am 17.6. (MH), 2,4 ab 27.6. und 11 (!) ab 12.7. (M.Deutsch). Im Erm. im Juli 3 (vermutlich 2,1 - HJ), bei Immenstaad 2 Übersommerer (BS). Außerdem 1,1 am 14.6. östlich Bodman (HR).

Gänseäger: Der Mauserplatz Rhd. war schwächer als 1985 besetzt: 20 am 15.6. (MH), 70 am 5.7. (VB), 170 am 23.7. (HR), maximal 240 im August (VB). Außerdem 18 und 1,1 am 9. und 15.6. Immenstaad (BS, A.Stürmer), 1,1 am 20.6. bei Wallhausen (T.Jaich), je 1 am 15.6. Erm. (MD) und 19.7. Überlingen (BS).

Schwarzmilan: Die Bedeutung der Mülldeponie Böhringen-Rickelshausen als Mauserplatz schwindet mehr und mehr, weil der frische Müll jetzt rasch mit Aushub abgedeckt wird und der größte Teil des Mülls in ein Kompostwerk kommt. Den ganzen Juli hindurch wurden maximal 77 gezählt, Anfang August nur noch 2 (HR,SS). Am 12.7. aber 27 bei der Kläranlage Ramsen (HWe).

Rohrweihe: Im Wollr. keine Brut (HJ). Einzelne Übersommerer (♀ bzw. vorjährige) Mett. (SS), Rhd. (ASö) und Wollr. (J.Heier).

Korn-/Wiesenweihe: Je 19 am 29.6. Mindelsee (U.Querner), 20.7. Weitenried (GT) und 20.8. Böhringen (R.Oppermann,SS). Die beiden letzten Daten betreffen fast sicher Kornweihen.

Wachtel: Im Rhd. 7 Reviere (VB,ASt,PW). Drei Rufer Ende Mai/Anfang Juni bei Lustenau (K.Müller), 1 am 1.6. Litzelstetten (BPO) und im Juli bei Mindersdorf (HWe).

Wasserralle: Im Wollr. 18 Rufplätze (J.Heier,HJ), im Mettnauteich 6 (SS), Nügelried Allensbach 3 (SS), Erisk. 2 - 3 (MH,GK), Radam. 3 (AB) sowie je 1 Stockam. und Schanderied (HWe), Altweiher/Teuringer Ried (GK) und Killenweiher (Th.Gönner).

Tüpfelsumpfhuhn: Am 10.8. im Sd. mind. 2 flugunfähige juv. (VB).

Kleines Sumpfhuhn: Brutverdacht im Rhd. (PW). Am 22.6. ruft 19 im Erisk. (MH,GK), am 29.6. ruft 18 Mett. (SS).

Wachtelkönig: Rhd. 1 - 2 Reviere (ASö,PW), Lau 2 Sänger (ASö).

Bleßhuhn: An der Mainaubrücke eine Schachtelbrut: ein Paar mit 6 erwachsenen und 7 frisch geschlüpften juv. am 27.7. (RSö).

Kiebitz: Mit 30 Paaren im Rad.Aachried deutlich höherer Bestand als im Vorjahr mit 19 (AB), dagegen keine Änderung mit 15 Revieren im Hausener Aachried (SS). Im Rhd. lag der Bestand mit 146 Paaren erheblich unter dem des Spitzenjahres 1984 mit 201 (VB,ASt,PW).

Der Mauserplatz Weitenried war nicht besetzt (SS,GT). Im Rad. Aachried im Juli 80 - 9P (HR,SS).

Bekassine: In fast allen Gebieten weitere Abnahme oder ähnlich geringer Bestand wie im Vorjahr: Rad.Aachried 2 - 3 wie im Vorjahr (ASm), Mett. 4 - 5 wie im Vorjahr (ASm), Schanderied 0 gegenüber 4 (HWe), Erisk. 0 wie im Vorjahr (GK), Hausener Aachried 0 gegenüber 1 (SS), Rhd. 32 gegenüber 38 (VB,ASt,PW). Nur im Wollr. wieder guter Besatz wie im Vorjahr: 21 statt 22 (J.Heier, HJ).

Uferschnepfe: Nach dem Spitzenjahr 1985 mit 18 Revieren zwar wieder Abnahme auf 13 Paare, aber immer noch hoher Bestand (VB,ASt, PW). Außerdem 2 Reviere im Lau. (ASö).

(Nr. 102/September 1986)

Großer Brachvogel: Mit 9 Paaren im Rhd. gleicher Bestand wie im Vorjahr, aber alle ohne Bruterfolg! (VB, ASt, PW). Die 2 Paare im Weitenried ebenfalls ohne Bruterfolg (SS).

Zwergmöwe: Einzug der Übersommerer im Erm. Anfang Juni: 3.6. 33 vorj. (J. Heier, M. Peintinger). Am 17.7. maximal 49 und am 22.7. wieder 33 (HJ). Im Erisk. ab 25.6. mind. 10 vorj., am 27.6. = 27, 28.6. = 54, zwischen Ende Juni und Ende Juli 20 bis maximal 40 am 20.7. und am 27.7. noch 10 (M. Deutsch, GK). Am 4.7. unter 34 vorj. bereits 1 diesjährige! (MH).

Lachmöwe: Im Wollr. ging der Bestand von 800 Paaren 1985 auf mind. 225 Paare 1986 zurück (J. Heier, M. Peintinger). Im Hagstaffelweiher Dettingen wurden 40 Nester gezählt (HJ) und am Kargegger Weiher Langenrain hielten sich 10 - 20 Paare auf (SS). Der Bestand an der Radam. hielt sich mit 35 Paaren auf der Höhe der letzten Jahre (AB).

Sturmmöwe: Im Mai an 3 Stellen der Fb auf Pfählen brütende, eine diesjährige am 14.7. im Wetterwinkel Rhd. (VB).

Heringsmöwe: Zwischen 11. und 26.7. im Erisk. 1 subad. (M. Deutsch, GK) und am 15.7. im Sd. 1 ad (RSo).

Weißkopfmöwe: In diesem Jahr lag der Einzug großer Trupps sehr früh. Bereits am 14.7. ca. 200, davon 40 immat., im Ww (HR) und am 20.7. mind. 29 (2/3 ad und 1 diesj.) im Erisk. (M. Deutsch, GK).

Flußseeschwalbe: An der Bregam. etwa 40 erfolgreiche Paare (D. Bruderer). Ebenfalls 40 Paare im Wollr., wo der Bruterfolg mit 1,5 juv./Bp. gut war (H. Stark). Im Sd. noch am 22.8. ein nicht flügger juv. (GA).

Zwergseeschwalbe: Am 29.6. im Erisk. 1 (MH, GK).

Trauerseeschwalbe: Zwischen 28.6. und 20.7. im Erisk. 14 bzw. 21 Ex. (M. Deutsch, GK).

Hohltaube: Bei der Greifvogelbestandsaufnahme auf dem Bodanrück wurden auf 135 km² Fläche 12 Reviere gefunden (HR). Bei Meersburg ein Revier (H, J, Walliser). Der Brutplatz im Erisk. war nicht besetzt (GK).

Schleiereule: Im Raum Frhf. nur zwei Bruten in Rammethofen und Sammetshofen (W. Maier).

Steinkauz: Trotz des schneereichen und kalten Winters bei Frhf. leichte Erholung von 9 auf 12 Brutpaare + ein lediges ♂ (GK).

Mauersegler: Noch bis 28.8. Nistplatzanflüge in Rad. (SS).

Eisvogel: Ende April balzte ein Paar im Erisk. Mehrmaliges Hochwasser der Schussen hat vermutlich eine erfolgreiche Brut verhindert (MH).

Wiedehopf: Unterhalb Tettngang wahrscheinlich eine Brut: ein Paar bis Mitte Juli anwesend (fide GK).

Wendehals: Im Raum Immenstaad - im Gegensatz zu allen anderen Meldungen - mit 8 - 9 Revieren außerordentlich hoher Bestand (BS). Sehr geringen Bruterfolg meldet U. Arnold von Hagnau: von 11 bzw. 9 Eiern wurden nur 2 bzw. 3 Junge flügge.

Uferschwalbe: In den Kiesgruben Überlingen am Ried 175, Böhlingen 20 (SS), Neuhausen 25 (W. Friedrich, B. Scherbarth) und Binningen ca. 20 Röhren (R. Specht, AT). Markelfingen 0 (SS).

(Nr. 102/September 1986)

Mehlschwalbe: In Rad. 427 besetzte Nester - höchster Wert seit Beginn der Zählungen 1967! (W.Fiedler, M.Peintinger, K.Mühl, ASm, SS u.a.). Sonst keine Meldungen.

Wiesenpieper: Im Hartweiher/Heudorfer Ried 1 mit Futter am 13.6. (ASm,SS u.a.).

Schafstelze: Im Rhd. 102 Reviere (VB,ASt,PW). Zwischen Stein, Stammheim und Diessenhofen 43 revieranzeigende ♂ gegenüber 37 im Vorjahr (W.Schümperlin). Hemishofen-Ramsen 14 Reviere gegenüber 13 (UW), dagegen im Rad.Aachried weiterhin niedriger Bestand mit 2 - 3 Paaren (AB,ASm).

Nachtigall: Am 20.5. zwischen Lustenau und Hohenems 4 singende - später Durchzug? (K.Müller). Im Erisk. mind. 8 (GK), im Wollr. 22 Reviere gegenüber 17 im Vorjahr (MD,J.Heier,HJ), Gottlieben-Tägerwilen 8 gegenüber 6 (Etha), Rad.Aachried 14 gegenüber 12, Mett. 14 gegenüber 8 und Schanderied mind. 11 gegenüber 10 im Vorjahr (ASm) - also fast durchweg höhere Zahlen als 1985!

Braunkehlchen: Im Rad.Aachried und im Heudorfer Ried/Hartweiher je 5 Reviere (R.Oppermann,ASm) - gleichbleibender Bestand.

Schwarzkehlchen: Je eine Brut im Lau. (6.7., ASö) und im Fußacher Ried (6./7.8. ein Paar mit 2 juv., M.Deutsch,J.Oeltjenbruns).

Schlagschwirl: Vom 15. -30.6. singt 1 bei Dettingen (T.Jaich).

Rohrschwirl: Bis 1.6. ein Sänger im Rotachaltwasser Erisk. (GK), am 8.7. singt noch 1 am Rsp. (VB), im Wollr. 11 singende ♂ gegenüber 15 im Vorjahr (J.Heier,HJ), Stockam. 2 singende am 20.5. und Rad.Aachried im Mai 1 und im Juli bis zu 2 Sänger (AB,H.P.Fischer). Mett. kein Nachweis! (SS).

Drosselrohrsänger: Im Bereich Wollr./Erm. mit 24 singenden ♂ deutlich weniger als die 32 im Vorjahr (J.Heier,MD,HJ), im Rad.Aachried 2 Reviere (AB,ASm), 12 singende ♂ am 28.5. im Schleienloch/Rhd. (VB). Eine leichte Erholung ist dagegen in kleinen Weihern festzustellen: Hagstaffelweiher Brutnachweis mit 3 juv., Dingelsdorfer Ried 1 Revier (HJ,T.Jaich), Killenweiher 3 Paare (Ch.Göbner), Kargegger Weiher 1 Revier (SS) und Bündlisried 1 Sänger am 22.5. (T.Jaich).

Gelbspötter: Auf der Mett. mit mind. 6 Revieren (ASm) und im Stadtpark Frhf. mit ebenfalls 6 Sängern gegenüber maximal 3 in den Vorjahren (Ch.Braunberger) außergewöhnlicher Bestand. Im Wollr. mit 2 Revieren (J.Heier,HJ) und im Schanderied mit 8 Revieren (ASm) eher normaler Bestand.

Zwergschnäpper: Am 18.5. singt 1 ♂ ohne rote Kehle in Hohenems (ASö).

Bartmeise: Im Wollr. 16 Reviere (J.Heier,HJ). Am 8./10.8. auf dem Sd. 1♀ vermutlich mit 3 - 4 juv. (VB,E.Winter) - erster Hinweis auf eine mögliche Brut im Rhd.

Beutelmeise: Im Rhd. 2 Bruten im Sd. und Schleienloch - am 25.8. ein eben flügger juv. (VB,MH,ASö). Brutverdacht auch im Erisk., wo sich 1 - 2 bis 1.6. aufhielten (MH,GK,G.Stadler). Im Wollr. u.a. 4 vollständige Nester - Bruterfolg unbekannt (MD,J.Heier,HJ). Im Raum Rad.-Moos 2 Brutnachweise im Rad.Aachried und bei Böhlingen (K.Mühl,ASm,SS) und Brutverdacht Mett. und Markelfinger Winkel (SS).

Rotkopfwürger: Bei Schlatt am Randen/Hegau 2 Reviere (AT).

Dohle: Zwischen Überlingen und Sipplingen 12 Paare in Molassefelswänden (D.Koch). Im Raderacher Ried unverändert mind. 3 Bruten (MH), bei der Uni Kstz. bis Ende Juni 2 Paare (RSo) -

(Nr. 102/September 1986)

sonst vom Bodanrück keine Brutmeldung (Mitarbeiter Greifvogelzählung). Im Wald bei Oberteuringen 1 Paar (GK). Fehlanzeige im Tettlinger Wald (GK). Auch die Brutkolonie in Hagnau ist erloschen (U.Arnold).

Saatkrähe: Am 24.6. bei der Uni Ketz. 1 vorjährige (RSO).

Nebelkrähe: Am 16.6. bei Meersburg 1 unter 20 Rabenkrähen (H.J. Walliser).

Erlenzeisig: Je 1♂ am 17.5. Bregam. singend (AS8) und 2.7. Ketz. (RSO).

Birkenzeisig: Im Sd. 2 Reviere - dabei ein Brutnachweis (MH, AS8), Erisk. 1 - 2 und Frhf.-Stadt 3 Brutpaare - dabei ein Paar mit 3 juv. am 13.9. (MH, GK).

Zaunammer: Vom 17.5. - 2.6. eine in Immenstaad (BS). Im September füttert 1,1 mind. 2 juv. in Ketz.-Allmannsdorf (RSO).

Grauanmer: Im Rhd. 19 Reviere (VB, ASt, PW). 3 Sänger an der Südflanke des Hohenhewen (HeWe), 1 singt am 21.5. im Heudorfer Ried (ASm), 2 Reviere im Hausener und 1 im Bohlinger Aachried (SS). Keine Beobachtung mehr aus dem Rad. Aachried und vom Galgenberg bei Bohlingen (AB, ASm).

- - - - -

Vorläufiges Ergebnis der Greifvogel-Bestandserfassung 1986

auf dem Bodanrück

Nach 1968/69 und 1974/75 wurde 1986 wieder eine Greifvogel-Bestandsaufnahme auf dem 135km² großen Bodanrück mit 10 Mitarbeitern durchgeführt.

	1968	1969	1974	1975	1986
Mäusebussard	45	49	43	42	43
Sperber	3	1	1	1	11
Habicht	0	1?	1?	0	5
Schwarzmilan	30	25	33	31	28
Wespenbussard	9	5	5	2	3
Rohrweihe	0	0	0	1	0
Baumfalke	6	2	4	1	5
Turmfalke	25	31	23	27	18
Greifvogelreviere	118	114	110	105	113

Bei Sperber und Habicht hat also ein erfreulicher Bestandsaufbau stattgefunden - es wurden etwa wieder die von H.Sonnabend für die 50er Jahre angegebenen Bestände erreicht!! Die Zahlen vom Wespenbussard zeigen dagegen eine fast stetige und erschreckende Abnahme. Sehr konstant sind die Werte bei Schwarzmilan und vor allem Mäusebussard - ganz im Gegensatz zu gelegentlichen Behauptungen von Jägern. Beim Turmfalken ist die niedrige Revierzahl möglicherweise durch die beiden letzten strengen Winter mitbedingt.

H.Reinhardt

- - - - -

Der nächste Rundbrief enthält den Bericht über den Herbst 1986. Bitte senden Sie Ihre Meldungen bis spätestens 20. November an Harald Jacoby, Beyerlestr. 22, D-775 Konstanz Tel. 07531/65633).