

Nr. XXIII/Juli 1966

ORNITHOLOGISCHER RUNDBRIEF
für das Bodenseegebiet

zusammengestellt von

Harald Jacoby, Gerhard Knötzsch und Siegfried Schuster
für die

ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT BODENSEE

Nur zur persönlichen Information; gilt nicht als Veröffentlichung!

Der Winter schien in diesem Jahr schon Mitte Februar zu Ende. Bis Mitte März herrschte außergewöhnlich mildes Wetter (+10 Grad C), so daß einzelne Exemplare von Zilpzalp und Hausrotschwanz früh zurückkehrten. Ein Temperatursturz ab 12. März mit Schneefall und Nachtfrösten brachte dann jedoch Verzögerungen beim Einzug einiger Arten und Stauungen (über 200 Kiebitze bei Tettnang, 3000 Wacholderdrosseln im Erisk., 3500 Ringeltauben im Rhd.).

Die Erwärmung um die März/April-Wende brachte schlagartig mehrere Zugvogelarten; in den Städten verschwanden die letzten Zeisigtrupps (Radolfzell, Möggingen, Friedrichshafen). Der ganze April war warm (meist um 15 Grad C, manchmal bis 20 Grad C), so daß bereits Mitte des Monats die Birnbäume in voller Blüte standen. Das außergewöhnlich frühe Auftreten einiger Arten mag damit zusammenhängen: Wachtel, Wachtelkönig, Grauschnäpper, Gelbspötter.

Die letzten Schlickflächen an den Seeufern verschwanden bei Pegel 330 bereits um den 20. April. Dadurch waren den spätziehenden Limikolenarten geeignete Rastmöglichkeiten entzogen. Dazu kommt noch, daß einer der für den Watvogeldurchzug günstigsten Plätze am Bodensee, die Harder Bucht im Rhd., nunmehr völlig ausgebagert wurde und damit ornithologisch nahezu bedeutungslos geworden ist.

Erstmals bemerkten wir im Frühjahr stärkeren Durchzug von Tüpfelsumpfhühnern, wahrscheinlich eine Folge des hohen Wasserstandes.

Leider nimmt die Kette von Abschüssen seltener Vogelarten kein Ende: von ca. 10 Bienenfressern, die in Lustenau erschienen, wurden drei erlegt.

- - - - -

Folgende Abkürzungen werden verwendet:

Beobachternamen: H.Bandorf (HB), V.Blum (VB), E.Dobler (ED), W.Frenz (WFr), H.G.Goldscheider (HG), H.Jacoby (HJ), G.Jung (GJ), T.Kammermöns (TK), B.Keist (BK), G.Knötzsch (GK), H.Leuzinger (HL), R.Looser (RL), W.Maier (WM), E.Meindl (EM), P.Miotk (PM), K.Mühl (KM), A.Müller (AM), K.Müller (KMü), R.Ortlieb (RO), S.Schuster (SS), H.Sonnabend (HS), J.Szijj (JS), E.Thalmann (ETha), G.Thielcke (GT), E.Thimm (ET), H.Walter (HWa), P.Willi (PW), W.Zeitz (WZ).

Ortsbezeichnungen:

Erisk.	-	Eriskircher Ried	Mett.	-	Halbinsel Mettnau
Erm.	-	Ermatinger Becken	Rad.	-	Radolfzell
Frhf.	-	Friedrichshafen	Rhd.	-	Rheindelta
Kstz.	-	Konstanz	Wollr.	-	Wollmatinger Ried

- - - - -

Wir danken allen Beobachtern, die uns ihr Material für diese Zusammenstellung überließen.

Frühjahrsbeobachtungen 1966

Prachtttaucher - *Gavia arctica*: Wie im Vorjahr nur noch im Mai ganz spärlich: 8.5. Güttingen 4 immat. (HJ) und 15.5. Erisk. 2 (W.Hermann).

Ohrentaucher - *Podiceps auritus*: Bei Luxburg vom 5.4. - 9.5. 1 Ex. vom Winter- ins Sommerkleid umfärbend (GJ, M.Pfändler).

Schwarzhalstaucher - *Podiceps nigricollis*: Am 31.3. im Überwinterungsgebiet Schweizer Oberseeufer noch 31 Ex. (GJ), am 17.4. Reichenau ein Trupp von 40 Ex. (HJ), sonst nur wenige.

Seidenreiher - *Egretta garzetta*: Am 12.5. flog 1 Ex. von der Bregenzer-Achmündung nach NE (VB); am 21.5. im Erisk. 1 Ex. (WFr, PM). Am 12.6. fischten 2 Ex. am völlig offenen Ufer des periodisch erscheinenden ca. 1 ha großen Litzelsees bei Markelfingen und flogen abends auf die Bäume der Mettnauspitze ab (HJ, SS).

Nachtreiher - *Nycticorax nycticorax*: Durchzug zwischen 11.5. (Wollr. 5 Ex., HJ) und Mitte Juni (einzelne Wollr. + Rhd.) mit max. 9 ad. am 21.5. im Erisk. (WFr, PM). Im Rhd. - soweit bestimmt - nur juv. (max. 3 am 9.6., VB).

Rohrdommel - *Botaurus stellaris*: Vom 26.3. - 5.4. am Mindelsee 1 rufendes Männchen (HS, SS).

Weißstorch - *Ciconia ciconia*: 1 Ex. mit Sempacher Ring rastete am 9.3. in Litzelstetten (G.Zink). Im Rhd. am 8. + 9.4. 1 Ex. (BK), in Möggingen vom 28.4. - 3.5. 1 - 2 Ex. (R.Kuhk, HS).

Singschwan - *Cygnus cygnus*: Siehe OR XXII unter Zwergschwan(?). Zu dem juv. aus dem Rhd., der außer der Größe alle Merkmale eines Singschwanes zeigte, gesellte sich am 11.4. 1 ad. Singschwan (GK). Beide Vögel blieben bis 22.5. im Erisk. (PM).

Graugans - *Anser anser*: Vom 15.3. - 31.3. wurde im Rhd. mehrmals 1 Ex. beobachtet (VB, ED).

Brandgans - *Tadorna tadorna*: Siehe OR XXII! Bis 1.4. blieben 5 Ex. im Rhd. (VB), bis 8.4. noch 1 (BK). Am 15.5. landete 1 Ex. ganz kurz im Erm. (HJ, SS).

Da der Abzug der überwinternden Entenscharen bzw. der Frühjahrsdurchzug durch die Wasservogelzählung nur schlecht erfaßt wird, soll hier kurz darüber berichtet werden:

Pfeifente - *Anas penelope*: Am Überwinterungsplatz Rad.Aachmündung letztmals am 20.3. 11 Ex. (SS). Am 27.3. im Erisk. die für das Gebiet hohe Zahl von 22 Ex. (WFr). Bis Mitte April einzelne im Rhd. + Erm. (Letztdatum 23.4. Erm. 0, 1 HG).

Schnatterente - *Anas strepera*: Der Durchzug kulminierte mit je 60 Ex. im Erm. + Erisk. Ende März/Anfang April (HJ, GK) und war am 17.4. praktisch zu Ende (Erisk. 26 Ex.; Erm. 6, 6 GK, HJ).

Krickente - *Anas crecca*: In den beiden wichtigsten Frühjahrs-Rastgebieten gab es folgende Zahlen:

	Erm.	Rhd.
Anfang April	500 (ET)	105 (HL)
17.4.	160 (HJ)	33 (VB)
23./24.4.	33 (HJ)	2,2 (VB)

Spießente - *Anas acuta*: In der 2. Märzhälfte im Erm. bis 170 Ex., am 1.4. noch 130 (HJ). Zur gleichen Zeit im Erisk. 110 Ex. (26.3., GK). Der Durchzug endete bereits in den ersten Apriltagen: 4.4. Erm. nur noch 26 (HJ), 6.4. Rhd. noch mind. 20 (HL), Nachzügler bis 23.4. (Erm. 1,1 HG).

Knäkente - *Anas querquedula*: Erst am 12.3. im Erm. 1,1 (HJ). Dort wurden das ganze Frühjahr hindurch nie mehr als 30 Ex. erfaßt (17.4. HJ). Im Rhd. dagegen am 6.4. mind. 65 (HL). In beiden Gebieten ungefähr am 24.4. die letzten Durchzugstrupps.

Löffelente - *Anas clypeata*: Nach den spärlichen Winterbeobachtungen begann Ende März schlagartig der Durchzug: 22.3. Mettnauspitze 11,3 (SS), 31.3. Rhd. 46 (GJ), 6.4. Rhd. 85 (HL), 9.4. Erm. 48 (ET). Er war bereits am 17.4. beendet.

Kolbenente - *Netta rufina*: Der Einzug begann am 25.2. (Gnadensee 6,2 HJ). Im März/April lagen wieder größere Trupps am Schweizer Oberseeufer: 12.3. Kreuzlingen 35,17 (HJ), 2.4. Kreuzlingen - Güttingen 21,12 (GJ, HJ). Im Erm. am 3.4. 55 Ex., Ende April und besonders im Mai eine schwer zu erklärende plötzliche Zunahme auf max. 230 am 4.5. (HJ). Vielleicht sind darin die größeren Trupps enthalten; die WM am 11.4. im Erisk. (40 Ex.) und HL am 17.4. zwischen Steckborn und Mannenbach (39,28) zählten. Im Rhd. nie über 25 Ex.!

Reiherente - *Aythya fuligula*: Größere Trupps lagen Anfang April noch im Erm. (120 Ex. HJ), im Rhd. (über 100 HL) und zwischen Kreuzlingen und Münsterlingen (44 Ex. GJ, HJ). Im Rhd. noch bis 17.4. 40 Ex. (BK, PW). Ende April war der Durchzug im wesentlichen beendet.

Bergente - *Aythya marila*: Nach dem völligen Fehlen im Winter tauchte die Art ab 25.2. (1,1 vor Ermatingen HJ) als Durchzügler auf: Im Rhd. vom 12.3. (6,1 KMü) bis 14.4. (3,4 HJ, SS) max. 11 Ex. am 31.3. (GJ). Im Erm. bis 11.4. (2,1 GJ) und im Gnadensee 1,0 noch am 23.4. (HJ).

Eisente - *Clangula hyemalis*: Keine Winterbeobachtungen, aber 2 Durchzugsdaten: 6.4. Rhd. 1,0 immat. (HL), 17.4. deutsches Oberseeufer 3 Ex. (JS).

Trauerente - *Melanitta nigra*: Nur 5.4. Luxburg 0,1 (GJ).

Zwergsäger - *Mergus albellus*: Nachdem die Wintergäste wie üblich Anfang April verschwunden waren, hielt sich 1,0 noch bis zum 30.5. im Erisk. auf (GK, WM). Vermutlich das gleiche Ex. sah M. Bühler schließlich am 25.6. im Rhd. Der Vogel war voll flugfähig.

Mittelsäger - *Mergus serrator*: Siehe OR XXII! Bis 17.4. am Rhein bei Bibermühle 0,1 (HL). Noch am 1.5. im Erisk. 0,1 (WFr, GK).

Steinadler - *Aquila chrysaetos*: Aus der weiteren Umgebung meldete ED eine Beobachtung: 12.4. im Weitried bei Rankweil 1 Ex.

Wespenbussard - *Pernis apivorus*: Der spärliche Durchzug (und Einzug?) wickelte sich in der zweiten Maihälfte ab: 17.5. Mett. 1 (KM), 22.5. Rhd. 2 einzelne (HJ, AM, WZ), 24.5. dort 2 ziehend sowie 28. + 29.5. je 1 Ex. (BK), 1.6. Rhd. nochmals 1 Ex. (HL).

Rohrweihe - *Circus aeruginosus*: Vom 23.3. (Wollr. 1,0 ET) bis in den Juni hinein wurden meist einzelne Rohrweihen beobachtet. Hauptdurchzug Ende März - Mitte April: 30.3. Rhd. 1,3 (VB), 11.4. Rhd. 5 Ex. am Schlafplatz im Schilf (HJ, SS), 16.4. Rhd. 0,3 (BK, KMü, PW). Ein völlig braunes Ex. hielt sich am 30.3. im Wollr. und am 6.4. im Rad. Aachried auf (HJ, SS).

Wiesenweihe - *Circus pygargus*: Am 30.4. 1 fast ausgefärbtes Männchen bei Weingarten (RO). Bei Volkertshausen am 8.5. + 2.6. je 1 Weibchen, das am 22.5. von einem jungen Männchen begleitet wurde (SS, AM, HJ).

Schlangenadler - *Circaetus gallicus*: Ein Ex. am 22.5. im Rhd. (PW); der 3. Nachweis in neuerer Zeit.

Fischadler - *Pandion haliaetus*: 16 Beobachtungen vom 21.3. (Meiningen ED) - 21.5. (Rhd. VB) im Rhd., Erm., Erisk., Weitried bei Rankweil und am Mindelsee.

Rotfußfalke - *Falco vespertinus*: Im Wollr. am 26.4. 2,0 (HG, ET), 30.4. 1,0 (AM, ET) sowie vom 20. - 24.5. 0,1 (H. Buhl, HJ, AM, WZ); im Rhd. nur am 1.5. 1 Ex. (PW); im Weitried Rankweil 1 Ex. vom 20. - 30.5. (ED).

Tüpfelsumpfhuhn - *Porzana porzana*: Überraschend stark war der Durchzug dieser Art im Wollr. (wahrscheinlich günstiger Wasserstand im Großseggen- und Schilfgürtel). Am 30.3. riefen 6 Ex., am 1.4. mind. 20 und bis 7.4. ca. 10 Ex. Dann waren bis zum 24.4. nur noch wenige zu hören (HJ, GJ, SS, ET).

Aus dem übrigen Seegebiet sind lediglich 2 Aprildaten bekannt: 2.4. Rad. Aachried 1 rufend (HJ, SS) und 16.4. Rhd. 2 Ex. (PW).

Zwergsumpfhuhn - *Porzana pusilla*: PW hörte im Rhd. am 29.5. abends 1 Ex. rufen.

Kleines Sumpfhuhn - *Porzana parva*: Eine frühe Feststellung eines Weibchens am 30.3. im Wollr. (HJ).

Kiebitz - *Vanellus vanellus*: Größere Zugtrupps im Rhd. am 12.3. = über 400 Ex. (KMü) und am 18.3. bei Tettwang über 200 Ex. (GK).

Seeregenpfeifer - *Charadrius alexandrinus*: Im Rhd. 10 Beobachtungen vom 1.4. - 1.6.: 1,1 am 1. + 2.4. (VB, ED, EM, RO), 3 Ex. am 24.4. (PW), dann im Mai mehrmals 1 Männchen bzw. 1 Weibchen (VB, HL, PW).

Goldregenpfeifer - *Pluvialis apricaria*: 2.4. Rhd. 5 Ex. (VB, EM, RO), 6. + 11.4. Rhd. je 1 Ex. (KMü, BK).

Steinwälzer - *Arenaria interpres*: Nur im Rhd. am 22.5. 2 Ex. und vom 25. - 29.5. 1 Ex. (VB, BK, PW).

Bekassine - *Gallinago gallinago*: 71 Ex. beisammen in einer Wiese bei Fußach am 29.3. (VB) und 35 bzw. 32 in abgemähtem Schilffeld im Wollr. am 2. + 9.4. (HJ, ET).

Regenbrachvogel - *Numenius phaeopus*: Im April wieder bemerkenswerter Durchzug: am 23.4. abends 18 im Rhd. und am 24.4. mind. 36 gleichorts (BK, PW). In Wiesengelände bei Volkertshausen am 9.4. = 3, 18.4. = 7, 1.5. = 12 (SS).

Uferschnepfe - *Limosa limosa*: Zughöhepunkt in der ersten Aprildekade: 6. + 8.4. Rhd. 33 Ex. (VB, ED) und 10.4. Wollr. 20 Ex. (GJ).

Pfuhlschnepfe - *Limosa lapponica*: 30./31.3. Rhd. 1 Ex. (VB, KMü).

Dunkler Wasserläufer - *Tringa erythropus*: Während der ganzen Zugzeit (17.3. - Juni) fast immer nur 1 - 2 Ex. im Rhd., Wollr. und bei Luxemburg (1x), ausnahmsweise 17 Ex. (Sommerkleid) am 19.6. im Rhd. (HJ, SS).

Rotschenkel - *Tringa totanus*: Die ersten Ex. erschienen sehr früh, nämlich am 27.2. im Rhd. (VB) und am 28.2. im Wollr. (GJ) je 1 Ex., jedoch blieb der Durchzug im üblichen Rahmen: max. 6 Ex. am 23.3. (ED) und 5 Ex. am 30.3. (VB) im Rhd.

Knutt - *Calidris canutus*: Ungewöhnlich frühzeitig traten Knutts im Wollr. und Rhd. auf: am 20.3. im Wollr. 5 Ex.; in den Tagen danach bis zum 26.3. verschwanden die Vögel nacheinander (HG, HJ, GJ, SS). Dafür sah VB am 30.3. im Rhd. mind. 1, wahrscheinlich sogar 3 Ex. Ein einzelner Vogel am 8.5. nochmals im Rhd. (KMü) und am 9.5. im Erisk. (GK).

Zwergstrandläufer - *Calidris minuta*: Nachdem diese Art im Frühjahr 1965 völlig fehlte, trat sie heuer wieder in geringer Zahl im Rhd. auf. Durchzugsspanne: 8.5. - 1.6. (KMü,HL); max. 4 Ex. am 27.5. und 29.5. (PW).

Temminckstrandläufer - *Calidris temminckii*: 19.5. Rhd. mind. 2 (HJ,SS) und 26.5. 1 Ex. (VB).

Sichelstrandläufer - *Calidris ferruginea*: Nur am 5.4. im Rhd. 1 Ex. (GJ).

Sanderling - *Calidris alba*: Wie gewöhnlich im Frühjahr, fand der Sanderling nur im Rhd. zusagende Rastplätze. In die kurze Zeit vom 19. - 27.5. fallen 5 Beobachtungen mit max. 5 Ex. am 21.5. (BK,PW).

Kampfläufer - *Philomachus pugnax*: Der Durchzug setzte am 27.2. ein (Wollr. 2 Ex. HJ), blieb aber in den ersten beiden Märzdekaden gering. Erst Ende März stiegen die Zahlen im Wollr. und Rhd. auf jeweils über 100 Ex. an, und in der ersten Aprilhälfte kulminierte der Durchzug mit 260 Ex. im Wollr. am 4.4. (HJ,ET) und ca. 300 Ex. im Rhd. am 14.4. (VB); im Wollr. gleichentags noch 150 Ex. (HJ).

Säbelschnäbler - *Recurvirostra avosetta*: Vom 20.5. - 29.5. 1 Ex. im Rhd. (VB,PW). Laut Angaben von Anwohnern waren sogar 5 Ex. gesehen worden; 1 Ex. wurde tot aufgefunden.

Triel - *Burhinus oedicnemus*: 21.5. Wollr. 1 Ex. (HJ).

Schwarzkopfmöwe - *Larus melanocephalus*: Im Rhd. am 31.3. 1 Ex. (ED) und am 4.4. 1 ad. (VB).

Zwergmöwe - *Larus minutus*: Im Rhd. und Wollr. beachtlich hohe Zahlen: 17.5. Rhd. 6 ad., 23 immat. (VB) und 15.5. Wollr. 13 immat. (HJ,SS,ET).

Dreizehenmöwe - *Rissa tridactyla*: Am 28.4. konnte GJ im Rhd. einen ermatteten Jungvogel greifen.

Trauerseeschwalbe - *Chlidonias niger*: Bedeutend größere Zahlen als im letzten Frühjahr, besonders im Erm.: Der erste Vogel im Rhd. am 17.4. (KMü), am 18.4. bereits 8 über der Rheinmündung (ED), die Hauptmasse im Mai: 14.5. Frhf. 80 + Bad Schachen 40 (AM), 15.5. Rhd. 90 Ex. (PW) und im Erm. 175 (HJ,SS,ET). Bis Ende Mai im Rhd. und Erm. noch je ca. 20 (VB,HG), jedoch den ganzen Juni hindurch noch weitere Beobachtungen: 22.6. Erm. 13 (HJ), 23.6. Rhd. sogar plötzlich wieder 70 Ex. (VB).

Weißflügelseeschwalbe - *Chlidonias leucopterus*: Zwischen 4.5. und 2.6. im Rhd. + Erm. je max. 3 Ex. unter Trauerseeschwalben (VB,HJ,SS,PW).

Weißbartseeschwalbe - *Chlidonias hybrida*: Zwischen 15.5. + 2.6. im Rhd. und Erm. je 1 Ex. (VB,HJ,SS,ET,PW). Nur am 17.5. im Rhd. 3 Ex. (VB).

Raubseeschwalbe - *Hydroprogne caspia*: 1. + 2.6. im Rhd. 1 Ex. (VB,HL).

Zwergseeschwalbe - *Sterna albifrons*: 27. + 28.5. Rhd. 1 Ex. (VB,RO,PW, P.Schmid).

Brandseeschwalbe - *Sterna sandvicensis*: Am 29.5. im Rhd. 1 Ex. (VB,PW).

Ringeltaube - *Columba palumbus*: Durch die Kältewelle ab Mitte März kam es zu Zugstauungen bei Tettngang. im Rhd. (26.3. Höchster Ried ca. 3500 Ex. auf dem Boden, VB) und zwischen Dettingen + Langenrain (ca. 500 Ex., HJ).

Alpensegler - *Apus melba*: Am 24.4. im Rhd. und am 11.5. bei Meersburg je 1 Ex. (PW,HWa).

Bienenfresser - *Merops apiaster*: Ein Trupp von 8 - 12 Ex. fand sich am 8.5. in Lustenau an einem Bienenhaus ein. 3 Ex. sollen geschossen worden sein (lt. ED,KMü), obwohl der Bienenfresser auch in Vorarlberg zu den geschützten Vogelarten zählt!

Kurzzehenlerche - *Calandrella brachydactyla*: Wieder eine Beobachtung im Rhd.: 1.5. 1 Ex. (PW). Vergl. OR XXI.

Felsenschwalbe - *Ptyonoprogne rupestris*: 17.3. im Weitried bei Rankweil 12 Ex. (ED) und 11.4. Steinbruch Hohenems 5 Ex. (KMü). Dies sind die ersten Meldungen aus dem Vorarlberger Rheintal.

Brachpieper - *Anthus campestris*: Frühes Erscheinen im Rhd.: 9.4. bereits 11 Ex. (BK, PW), 12.4. 3 x 1 + 15 Ex. (HJ, SS), 16.4. 9 in einem Trupp, 30.4. 12 Ex., 1.5. 7 Ex. und 28.5. noch 1 Ex. (BK, PW); im Wollr. die letzten am 13.5. (HJ).

Rotkehlpieper - *Anthus cervinus*: 24.4. Rhd. 1 ziehend (GK), 28.4. Rhd. 1 rufend (GJ) und 29.4. Rhd. 3 Ex. (VB).

Alpenbraunelle - *Prunella collaris*: Rankweil am 29.3. 3 Ex. (ED).

Schwarzkehlchen - *Saxicola torquata*: Während im Frühjahr 1965 keine Beobachtung gemeldet wurde, liegen für den diesjährigen Durchzug überraschend viele Daten vor: 2.3. Wollr. 1,0 (ETha), 20.3. Wollr. 0,1 (HJ), 26.3. Rhd. 1,1 (VB), 30.3. Erisk. 1,1 (GK, WFr), 11.4. Rhd. 1,0 + 0,1 (VB), 13.4. Rhd. 1,0 (M. Neub).

Wacholderdrossel - *Turdus pilaris*: Schneeflucht am 14.3. im Erisk.: ca. 3000 auf Wiesen (WFr).

Rotdrossel - *Turdus iliacus*: Unter den Wacholderdrosseln am 14.3. im Erisk. auch ca. 150 Rotdrosseln (WFr); in Bodman am 13.3. 80 Ex. (HS).

Ringdrossel - *Turdus torquatus*: 26.3. Rhd. 1 Ex. (KMü), 31.3. Weitried bei Rankweil 7 Ex. (ED), 11.4. Rhd. 1 Ex. (R. Appenzeller) und 12.4. Rhd. 1 Ex. (HJ, SS).

Beutelmeise - *Remiz pendulinus*: Durchzug vom 30.3. bis 27.4. mit max. 5 Ex. am 3.4. (Wollr. HJ) an folgenden Orten: Rhd., Luxburg, Wollr.

Ortolan - *Emberiza hortulana*: Kleine Trupps an mehreren Orten: 23.4. Lauteracher Ried 4 Ex. (KMü), 24.4. Rhd. 14 Ex. (GK, WFr) und Kstz. 7 Ex. (HJ), 28.4. Luxburg 7 Ex. (GJ).

Birkenzeisig - *Carduelis flammea*: Am 11.4. Rhd. 1 Ex. (BK).

Eichelhäher - *Garrulus glandarius*: Zwischen 9. + 24.4. Durchzug im Rhd.; max. ca. 40 am 9.4. (BK, PW).

Saatkrähe - *Corvus frugilegus*: Im Gaißauer Ried/Rhd. am 29.5. noch 1 Ex. (A. Raab).

- - - - -

Erstdaten, Einzug und Durchzug 1966 im Bodenseeraum

Zwergdommel - *Ixobrychus minutus*: 3.5. Rhd. 2 (KMü), 8.5. Mett. 2 (SS).

Rotmilan - *Milvus milvus*: 28.2. Eschenz 1 (RL).

Schwarzmilan - *Milvus migrans*: 19.3. Erisk. 1 (GK), 20.3. Meersburg 1 Hwa).

Wachtel - *Coturnix coturnix*: 18. + 19.4. Mindelried 1 (GT).

Wachtelkönig - *Crex crex*: 29.4. Möggingen 1 (GT).

Flußseeschwalbe - *Sterna hirundo*: 31.3. Rhd. 1 (GJ), 2.4. Kreuzlingen 1 (HJ), 4.4. Erisk. 1 (GK) + Rhd. 7 (VB), 5.4. Rhd. 20 (GJ).

Turteltaube - *Streptopelia turtur*: 7.4. Rhd. 1 (KMü), 22.4. Wollr. 2 (ET), 1.5. Rhd. 1 (BK, PW) + Volkertshausen 1 (SS).

- Kuckuck - *Cuculus canorus*: 10.4. Kstz. 2 (AM,WZ), 11.4. Möggingen 1 (GT), 12.4. Wollr. 2 (ET).
- Mauersegler - *Apus apus*: 16.4. Mett. 1 (RO,SS), 21.4. Kstz. 3 (HG) + Mett. über 10 (SS).
- Wiedehopf - *Upupa epops*: 6.4. Rhd. 1 (HL), 8.4. Rhd. 1 (BK), 11.4. Rhd. 2 (BK).
- Wendehals - *Jynx torquilla*: 31.3. Rankweil 1 (ED), 5.4. Möggingen 1 HS.
- Uferschwalbe - *Riparia riparia*: 30.3. Rhein/Bibermühle 1 (HL,ETHa), 31.3. Rhd. 2 (GJ), 1.4. Wollr. 9 (HJ,SS).
- Rauchschwalbe - *Hirundo rustica*: 21.3. Lindau (D.Gebauer) + Rhd. 2 WFr, 26.3. Rhd. 10 (VB) + Meersburg 1 (Hwa), 29.3. Wollr. 1 (ET) + Rad.Aach 2 (SS), 30.3. "sehr große Scharen" Eschenz - Bibermühle (HL).
- Mehlschwalbe - *Delichon urbica*: 10.4. Moos einige (SS), 12.4. Güttingen/Bodanrück 1 (HB), 13.4. Möggingen 2 fliegen Nest an (HS).
- Schafstelze - *Motacilla flava*: 31.3. Rhd. 2 (GJ), 1.4. Wollr. 1 (SS), 2.4. Rhd. 1 (KMü), Münsterlingen + Güttingen je 1 (HJ,GJ).
- Neuntöter - *Lanius collurio*: 30.4. Kstz. 1,0 (WZ), 1.5. Erisk. 1,0 GK, 8.5. Markelfingen 1,0 (HJ).
- Rotkopfwürger - *Lanius senator*: 9.4. Steißlingen 1 (HJ,SS), 11.4. Rhd. 1 (ED), 27.4. Erisk. 1 (WFr) + Wollr. 1 (AM).
- Rohrschwirl - *Locustella luscinioides*: 3.4. + 4.4. Wollr. 1 (HJ), 20.4. + 27.4. Rhd. 1 (VB).
- Feldschwirl - *Locustella naevia*: 15.4. Wollr. 1 (HJ), 16.4. Wollr. 2 HJ, 17.4. Wollr. 1 (HJ) + Rad.Aach 1 (SS).
- Schilfrohrsänger - *Acrocephalus schoenobaenus*: 4.4. Wollr. 1 (HJ), 6.4. Mett. 1 gefg. (TK), 8.4. Wollr. 3 (HJ).
- Sumpfrohrsänger - *Acrocephalus palustris*: 28.4. Markelfingen - Möggingen 1 singend (GT), 14.5. Tägermoos 1 (ETHa), 15.5. Wollr. 2 (HJ).
- Teichrohrsänger - *Acrocephalus scirpaceus*: 23.4. Wollr. 1 (HG), 24.4. Wollr. 2 (HJ) + Rhd. 2 (ED), 26.4. Mett. 2 (SS).
- Drosselrohrsänger - *Acrocephalus arundinaceus*: 16. + 17.4. Wollr. 1, 23.4. Wollr. 3 (HJ).
- Gelbspötter - *Hippolais icterina*: 2.5. Möggingen 1 (HS), 12.5. Mett. 1 (SS).
- Gartengrasmücke - *Sylvia borin*: 27.4. Rhd. 1 (HG), 1.5. Wollr. 1 (HG), 2.5. Möggingen mehrere (HS).
- Mönchsgrasmücke - *Sylvia atricapilla*: 3.4. Möggingen 1,0 (HB), 4.4. Wollr. 0,1 (HJ), 5.4. Rhd. mehrere (VB) + Wollmatingen 2,0 (HJ).
- Klappergrasmücke - *Sylvia curruca*: 16.4. Wollr. 1 (HJ), 17.4. Dettingen (HS), Moos + Rad. je 1 (SS).
- Dorngrasmücke - *Sylvia communis*: 14.4. Rhd. 1 (HJ), 16.4. Wollr. 1 (HJ) + Mett. + Weingarten je 1 (RO,SS).
- Fitis - *Phylloscopus trochilus*: 26.3. Weingarten 1 (nur gesehen, RO), 31.3. Rhd. 1 (GJ), 1.4. Wollr. 1 (HJ), 3.4. Lustenau 4 (KMü) + Weingarten 1 (RO).
- Zilpzalp - *Phylloscopus collybita*: 27.2. Giehrenmoos 2 (ET), 3.3. Wollr. 2 (HG,HJ), 4.3. Markelfingen 2 (Ludescher), 6.3. Rhd. 8 (HG,GJ).

- Berglaubsänger - *Phylloscopus bonelli*: 12.4. Rhd. 1 (HJ,SS).
Waldlaubsänger - *Phylloscopus sibilatrix*: 14.4. Rhd. 6 (HJ,SS).
Grauschnäpper - *Muscicapa striata*: 22. + 23.4. Wollr. 1 (HG,HJ,ET),
2.5. Möggingen 1 (HS).
Trauerschnäpper - *Ficedula hypoleuca*: 15.4. Erisk. 0,1 (GK), 16.4.
Weingarten 1,0 (RO), 17.4. Bodanrück 1 (GT).
Braunkehlchen - *Saxicola rubetra*: 2.4. Rhd. 1 (VB), 9.4. Volkerts-
hausen 2 (HJ,SS).
Gärtenrotschwanz - *Phoenicurus phoenicurus*: 26.3. Frhf. 10! (WM),
27.3. Rhd. 1 (VB), 29.3. Rhd. 1 (VB).
Hausrotschwanz - *Phoenicurus ochruros*: 8.3. Romanshorn 1,0 (RL), 14.3.
Lindau 1 (D.Gebauer), 15.3. Immenstaad 0,2 (GJ).
Nachtigall - *Luscinia megarhynchos*: 16.4. Mett. 3 (N.v.Bodman).
Blaukehlchen - *Luscinia svecica*: 31.3. Rhd. 1 (GJ), 2.4. Rhd. 2 (ED,
KMü), 3.4. Weingarten 1 (RO), 4.4. Wollr. 4 (HJ).
Steinschmätzer - *Oenanthe oenanthe*: 30.3. Wollr. 1 (ET), 31.3. Erisk.
2 (GK), 2.4. Rad.Aach 1 (SS) + Rankweil 3 (ED).
Singdrossel - *Turdus philomelos*: 6.2. Mainauwald 1 (HJ), 19.2. Markel-
tingen 1 singend (HS), 21.2. Bodanrück 15 singend (HJ,SS).
Grauammer - *Emberiza calandra*: 22.2. Rhd. 2 (HJ,SS), 27.2. Gottlieben
1 (ETha), 6.3. Rad.Aach 1 (SS).
Stieglitz - *Carduelis carduelis*: 3.4. Rad. 1 (SS), 4.4. Wollr. 1 (HJ)
+ Güttingen/Bodanrück 2 (HB).
Pirol - *Oriolus oriolus*: 1.5. Volkertshausen (SS), Rhd. (VB) + Argen-
mündung (E.Steppacher) je 1.

Meldungen für den Sommer-Rundbrief erbitten wir bis spätestens
15. September 1966 an folgende Anschrift:

Harald Jacoby, 775 Konstanz, Beyerlestr. 22